INFEKTSIOONID

kodutest.ee

TIK'Alert®

Puukborrelioosi tuvastamise kiirtest

Tootja: Vedalab · enesetest koduseks kasutamiseks

PROOV	TULEMUS	TUVASTAB	TÄPSUS
Sõrmeotsaveri	**10 min**	**Borrelia IgM**	**>88%**

Mis on test?

Eesti on puukborrelioosi endeemiline piirkond ja puugihooaeg kestab varakevadest oktoobrini. Ravimata borrelioos võib kahjustada närvisüsteemi, liigeseid ja südant. TIK'Alert® tuvastab Borrelia-vastased IgM antikehad, mis tekivad esimesena ja viitavad hiljutisele nakatumisele – siis on võimalik nakkust antibiootikumidega piirata.

Kellele ja millal testida?

- 2–6 nädalat pärast puugihammustust
- Kui hammustuskohale tekib ringikujuline punetus (erythema migrans)
- Palavik, peavalu, liigese- või lihasvalu pärast looduses viibimist

Oluline teada

Kui hammustusest on möödas alla 2 nädala, ei ole antikehad veel tekkinud. Test ei näita haiguse staadiumi; varasem nakkus või tsütomegaloviirus võib anda positiivse tulemuse.

Kuidas testida?

1. Peske ja kuivatage käed, asetage testi osad puhtale lauale.
2. Puhastage sõrmeots ja torgake seda kaasasoleva lantsetiga.
3. Koguge veri pipetiga kuni märgitud jooneni.
4. Kandke veri kasseti prooviaknasse ja oodake 30–40 sekundit.
5. Lisage 4 tilka lahjendit, 2–3-sekundilise vahega.
6. Lugege tulemus 10 minuti pärast (mitte hiljem kui 15 min).

Tulemuse tõlgendamine

Positiivne tulemus

Veres on Borrelia-vastased IgM antikehad. Pöörduge kindlasti arsti poole, kes määrab vajaliku ravi.

Negatiivne tulemus

IgM antikehi ei tuvastatud. Korrake testi 2–6 nädala pärast. Lööbe või palaviku korral pöörduge arsti poole.

Kiirtest on mõeldud esmaseks enesetestimiseks ega asenda arsti diagnoosi. Lugege enne kasutamist pakendis olevat kasutusjuhendit. Täpsus = tootja hindamisaruannetes toodud kokkulangevus referentsmeetodiga.