ORGANID JA AINEVAHETUS

kodutest.ee

Gluten' Alarm®

Gluteenitalumatuse (tsöliaakia) kiirtest

Tootja: Vedalab · enesetest koduseks kasutamiseks

PROOV	TULEMUS	TUVASTAB	TÄPSUS
Sõrmeotsaveri	**15 min**	**t-TG IgA**	**≥97%**

Mis on test?

Tsöliaakia on elukestev autoimmuunne haigus, mille puhul nisus, odras ja rukkis leiduv gluteen kahjustab peensoolt. Hinnanguliselt puudutab see umbes 1% inimestest. Gluten' Alarm® tuvastab sõrmeotsaverest tsöliaakiaga seotud koetransglutaminaasi (t-TG) IgA antikehad.

Kellele ja millal testida?

- Krooniline kõhulahtisus, kõhuvalu, puhitus, kaalulangus
- Aneemia, äärmine väsimus, osteoporoos; lastel kasvupeetus
- Tsöliaakia esinemine perekonnas

Oluline teada

Testige tavapärase toitumise ajal. Gluteenivabal dieedil olles ei ole tulemus usaldusväärne.

Kuidas testida?

1. Peske ja kuivatage käed, asetage testi osad puhtale lauale.
2. Puhastage sõrmeots ja torgake seda kaasasoleva lantsetiga.
3. Koguge veri pipetiga kuni märgitud jooneni.
4. Kandke veri kasseti prooviaknasse ja oodake 30–40 sekundit.
5. Lisage 4 tilka lahjendit, 2–3-sekundilise vahega.
6. Lugege tulemus 15 minuti pärast (mitte hiljem kui 20 min).

Tulemuse tõlgendamine

Positiivne tulemus

Veres on t-TG IgA antikehad. Näidake tulemust arstile, kes otsustab täiendava uuringu vajaduse.

Negatiivne tulemus

Antikehi ei tuvastatud. IgA puudulikkus võib anda valenegatiivse tulemuse – püsivate sümptomite korral pöörduge arsti poole.

Kiirtest on mõeldud esmaseks enesetestimiseks ega asenda arsti diagnoosi. Lugege enne kasutamist pakendis olevat kasutusjuhendit. Täpsus = tootja hindamisaruannetes toodud kokkulangevus referentsmeetodiga.