INFEKTSIOONID

kodutest.ee

PYLORI-Screen®

Helicobacter pylori kiirtest

Tootja: Vedalab · enesetest koduseks kasutamiseks

PROOV	TULEMUS	TUVASTAB	TÄPSUS
Sõrmeotsaveri	**10 min**	**H. pylori antikehad**	**≥90%**

Mis on test?

Helicobacter pylori levib käte, toidu ja vee kaudu ning seda võib esineda kuni 80% eestimaalastest. Bakter võib põhjustada kroonilist gastriiti ja maohaavandeid – ligi 90% maohaavandiga patsientidest on nakatunud. PYLORI-Screen® tuvastab sõrmeotsaverest H. pylori vastased antikehad.

Kellele ja millal testida?

- Korduv maovalu või kõhuvalu
- Iiveldus ja seedehäired
- Maohaavandi kahtlus

Oluline teada

Antikehad võivad püsida ka pärast väljaravitud nakkust, mistõttu positiivne tulemus ei tähenda alati aktiivset infektsiooni.

Kuidas testida?

1. Peske ja kuivatage käed, asetage testi osad puhtale lauale.
2. Puhastage sõrmeots ja torgake seda kaasasoleva lantsetiga.
3. Koguge veri pipetiga kuni märgitud jooneni.
4. Kandke veri kasseti prooviaknasse ja oodake 30–40 sekundit.
5. Lisage 4 tilka lahjendit, 2–3-sekundilise vahega.
6. Lugege tulemus 10 minuti pärast (mitte hiljem kui 15 min).

Tulemuse tõlgendamine

Positiivne tulemus

Veres leiti H. pylori vastased antikehad. Näidake tulemust arstile, kes otsustab, kas on vaja täiendavaid uuringuid.

Negatiivne tulemus

Antikehi ei tuvastatud. Kui kõhuvalu või muud sümptomid püsivad, pöörduge siiski arsti poole.

Kiirtest on mõeldud esmaseks enesetestimiseks ega asenda arsti diagnoosi. Lugege enne kasutamist pakendis olevat kasutusjuhendit. Täpsus = tootja hindamisaruannetes toodud kokkulangevus referentsmeetodiga.