ORGANID JA AINEVAHETUS

kodutest.ee

THYRO-Check®

Kilpnäärme alatalituse kiirtest

Tootja: Vedalab · enesetest koduseks kasutamiseks

PROOV	TULEMUS	PIIRVÄÄRTUS	TÄPSUS
Sõrmeotsaveri	10 min	TSH 5 µIU/ml	98,1%

Mis on test?

Kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism) on üks levinumaid hormonaalseid häireid, eriti naistel. Hüpofüüsi toodetav hormoon TSH juhib kilpnäärme tööd ning selle kõrge tase viitab alatalitlusele. THYRO-Check® tuvastab sõrmeotsaverest kõrgenenud TSH taseme.

Kellele ja millal testida?

- Väsimus, kaalutõus ja pidev külmatunne
- Kuiv nahk, haprad juuksed, kõhukinnisus
- Unustamine, meeleolulangus, menstruaaltsükli häired

Oluline teada

Testi ei tohi kasutada, kui saate kilpnäärme hormoonravi.

Kuidas testida?

1. Peske ja kuivatage käed, asetage testi osad puhtale lauale.
2. Puhastage sõrmeots ja torgake seda kaasasoleva lantsetiga.
3. Koguge veri pipetiga kuni märgitud jooneni.
4. Kandke veri kasseti prooviaknasse ja oodake 30–40 sekundit.
5. Lisage 4 tilka lahjendit, 2–3-sekundilise vahega.
6. Lugege tulemus 10 minuti pärast (mitte hiljem kui 15 min).

Tulemuse tõlgendamine

Positiivne tulemus

TSH tase on üle 5 µIU/ml. Pöörduge arsti poole ja näidake talle testi tulemust.

Negatiivne tulemus

TSH tase on alla 5 µIU/ml ehk normi piires. Püsivate sümptomite korral pöörduge siiski arsti poole.

Kiirtest on mõeldud esmaseks enesetestimiseks ega asenda arsti diagnoosi. Lugege enne kasutamist pakendis olevat kasutusjuhendit. Täpsus = tootja hindamisaruannetes toodud kokkulangevus referentsmeetodiga.