INFEKTSIOONID

kodutest.ee

STREPA'Lert®

A-grupi streptokoki kiirtest

Tootja: Vedalab · enesetest koduseks kasutamiseks

PROOV	TULEMUS	TUVASTAB	TÄPSUS
Kurgukaabe	**5–10 min**	**Streptokokk A**	**96,4%**

Mis on test?

Enamik kurguvalusid on viiruslikud ja mööduvad ilma antibiootikumita. A-grupi β-hemolüütiline streptokokk (Streptococcus pyogenes) on aga kõige sagedasem bakteriaalse kurgupõletiku tekitaja ja võib tüsistuste vältimiseks vajada ravi. STREPA'Lert® näitab kiiresti, kas kurguvalu põhjuseks on streptokokk.

Kellele ja millal testida?

- Punane või turses kurk ja mandlid, valulik neelamine
- Peavalu, lihasvalu, iiveldus või loidus
- Enne arsti juurde minekut, et otsus oleks kiirem

Oluline teada

Täpne tulemus eeldab korrektselt võetud kurgukaabet. Ärge tõlgendage tulemust hiljem kui 10 minuti pärast.

Kuidas testida?

1. Peske käed ja asetage katsuti alusele.
2. Võtke tampooniga kaabe kurgu tagaseinalt ja mandlitelt.
3. Pange tampoon katsutisse, lisage 6 tilka lahust 1 ja 6 tilka lahust 2.
4. Keerutage tampooni ~10 korda ja laske seista 2–5 minutit.
5. Pigistage tampoon välja ja asetage testriba katsutisse.
6. Lugege tulemus 5–10 minuti pärast.

Tulemuse tõlgendamine

Positiivne tulemus

Kurgukaabes leiti A-grupi streptokokk. Pöörduge arsti poole, kes otsustab edasise ravi.

Negatiivne tulemus

Kurguvalu põhjus on tõenäoliselt viirus või ei sisaldanud proov piisavalt baktereid. Püsivate sümptomite korral minge arsti juurde.

Kiirtest on mõeldud esmaseks enesetestimiseks ega asenda arsti diagnoosi. Lugege enne kasutamist pakendis olevat kasutusjuhendit. Täpsus = tootja hindamisaruannetes toodud kokkulangevus referentsmeetodiga.